

Psykiatristöd – Regionalt vårdprogram Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Biverkningar vid antipsykotisk läkemedelbehandling

Läkemedel	Extrapyramidal a biv. / tardiv dyskinesi (Dopamin-D2 receptor blockad)	Prolaktin stegring (Dopamin- receptor blockad)	Viktuppgång Histamin H1 (Serotonin 5-HT receptor blockad) ^{2c}	Nedsatt glukos- tolerans Förhöjda lipider	Förläng- ning av QT- intervall	Sedation (Histamin H ₁ -receptor blockad)	Hypotension (Adrenerg α ₁ receptor- blockad)	Antikolinerga biverkningar (Muskarin- receptor- blockad)
Perfenazin	++	++	+	+?	(+)	+	+	(+)
Haloperidol	+++	+++	+	(+)	+	++ ^c	++	0
Klozapin ^a	0	0	+++	+++	(+)	+++	+++	+++
Risperidon	+	+++	++	+	(+)	+	++	0
Olanzapin	0	+	+++	+++	0	++	+	++
Quetiapin ^b	0	0	++	++	0	++	++	++
Ziprasidon	0	+	0	0-	++	0	0	0
Aripiprazol	+ ^d	0	0	0	0	0	0	0

0=inga biverkningar, ++=ibland biverkningar vid terapeutiska doser, +++=ofta biverkningar vid terapeutiska doser